Vorläufiges Verzeichnis der Arten der Gattung Tulipa.

Von

Boris Fedtschenko.

Oberbotaniker am Kaiserl, Botan, Garten Peters des Großen zu St. Petersburg,

Mit der Bearbeitung der Tulipeen für »Das Pflanzenreich« mich beschäftigend, möchte ich hier ein vorläufiges Verzeichnis der Arten der interessanten Gattung *Tulipa* mit der ganz allgemeinen Angabe ihrer geographischen Verbreitung geben.

Es sind zurzeit 148 Arten nach den Beschreibungen bekannt; von den meisten Arten habe ich die Herbarexemplare und öfters die Originalexemplare studiert; nicht wenige Arten hatte ich die Gelegenheit, auch im lebenden Zustande, sei es in der freien Natur, sei es in der Kultur, zu studieren. Diese letzteren Studien waren besonders wichtig für die Beurteilung des spezifischen Wertes verschiedener Merkmale.

Die geographische Verbreitung der Gattung *Tulipa* erstreckt sich auf ganz Europa, sowie Nordafrika und den größeren Teil von Asien, südlich bis Palästina, Mesopotamien, Indien (Himalaya) und China (vereinzelt in der Provinz Chekiang).

Es gibt einige Zentren von reichlich entwickelten Endemismen, wo eine Anzahl sich wenig voneinander unterscheidender Arten vorkommt; solche Zentren sind als neue Entwicklungszentren zu betrachten; die Frage, ob die in Südeuropa vorkommenden mit den orientalischen identischen Arten aus dem Orient stammen, ist auch höchstwahrscheinlich in dem Sinne einer frühgeschichtlichen Verschleppung zu betrachten; ähnliche Vorkommnisse können bei anderen Arten auch in der Jetztzeit beobachtet werden.

Es versteht sich von selbst, daß die Synonymie der Tulipenarten, deren Varietäten und detaillierte Angabe ihrer geographischen Verbreitung in meiner späteren Arbeit gegeben werden, wo auch die verwandtschaftlichen Verhältnisse Erläuterung finden sollen.

B. Fedtschenko.

I. Tulipanum Reboul.

A. Leioscapae.

- T. oculus solis St. Aman, Rec. Soc. Agr. Agen. I. 75. Südfrankreich, Italien, Spanien.
- T. cuspidata Stapf in Polak's Reise Nr. 25 (Denkschr. Akad. Wien L., S. 47 (4885)). — Persien.
- 3. T. Schmidtii Fomin in Moniteur du Jardin botanique du Tiflis, fasc. 14 (1909). Transkaukasien: Kreis Lenkoran.
- 4. T. praecox Ten., Fl. Napol. I., 170. Südfrankreich, Italien, Croatien, Palästina, Syrien, Mesopotamien.
- 5. T. apula Guss. in Ten. App. V. 2, p. 42 (1842). Italien.
- 6. T. systila Stapf in Polak's Reise Nr. 24. Persien.
- 7. T. maleolens Reboul, Tulip. spec. App. 4. Italien.
- 8. T. heterochroa Freyn, Oriental. Pflanzenarten, in Bull. Herb. Boiss. 4896, S. 454. Kleinasien.
- 9. T. chrysantha Boiss. in Kotschy, Pl. pers. bor. No. 78. Persien, Afghanistan, Beludschistan.
- 10. T. amabilis B. Fedtsch. n. sp. Transkaspien.
- 11. T. montana Lindl. in Botan. Register I., 1106. Armenien, Persien, Arabien, Afghanistan, Kurdistan.
- 12. T. Julia C. Koch in Linnaea XXII. (1849) p. 225. Transkaukasien.
- 13. T. Dammani Rgl. in Acta Hort. Petrop. X., p. 688 (1889). Libanongebirge.
- 14. T. Martelliana Lev., Les Tulipes de l'Europe, p. 52. Mesopotamien.
- T. Straussii Bornm. in Mitt. Thür. Bot. Ver., Neue Folge XXIX.,
 p. 43 (1912). Persien.
- 16. T. sultanabadensis Spreng. in Bull. Soc. Tosc. Ort. XIX. (1894) p. 230. Persien.
- 47. T. Levieri Spreng. in Bull. Soc. Tosc. Ort. XIX. (1894) p. 230. Persien.
- 18. T. Haussknechtii Lev., Les tulipes de l'Europe, p. 52. Mesopotamien.

B. Scabriscapae.

- 19. T. Tubergeniana Hoog. in Gard. Chron. XXXV. (1904, vol. 1) p. 358.— Buchara.
- 20. T. lanata Rgl., Descr. pl. nov. fasc. 9 in Acta Hort. Petrop. VIII. (1884) p. 647. Turkestan.
- 24. T. Hoogiana B. Fedtsch. in Gard. Chron. XLVIII (1910, vol. 2) p. 53. SO.-Buchara.
- 22. T. kuschkensis B. Fedtsch. n. sp. Transkaspien.

- 23. T. Fosteriana Hoog. in litt. Buchara.
- 24. T. ingens Hoog. in Gard. Chron. XXXII. (1902, vol. 2) p. 14. Buchara.

II. Clusianae.

- 25. T. stellata Hook. in Botan. Magaz. t. 2762. Indien.
- 26. T. Clusiana Vent. in Red. Liliac. t. 37 (1802). Frankreich, Spanien, Italien, Südtirol, Balkan-Halbinsel, Syrien (?), Persien (?).

III. Gesnerianae.

A. Leioscapae.

- 27. T. aurata Litw., Verz. Pfl. ges. Berg N. 197 (1905). Syr-darja-Gebiet.
- 28. T. Lehmanniana Merckl. in Bunge, Rel. Lehm. N. 1390 (1851). Syr-darja und Buchara.
- 29. T. Borsczowi Rgl. in E. Regel et Herder, Enumer. pl. Semenow. N. 1042 in Bull. de Moscou 1868, fasc. 2. Syr-darja-Gebiet.
- 30. T. Maximowiczii Rgl. in Acta Horti Petr. X. (1886) p. 687. Ost-Buchara.
- 34. T. Wilsoniana Hoog. in Gard. Chron. XXXII. (1902, vol. 2) p. 50.

 Ost-Buchara.
- 32. T. linifolia Rgl. in Acta Horti Petr. VIII. (1884) p. 648. Ost-Buchara.
- 33. T. platystigma Jord. in Bill. ann. 1855, p. 33. SO.-Frankreich.
- 34. T. Korolkowi Rgl., Descr. pl. nov. in Acta Horti Petr. III. 295 (1875).

 Turkestan.
- 35. T. nitida Hoog. in Gard. Chron. XXXI. (1902, vol. 1) p. 350. Buchara.
- 36. T. lurida Lev., Or. tul. sav. it. p. 45. Italien.
- 37. T. Fransoniana Parl., Monocotyl. p. 15 (1854). Florenz.
- 38. T. spathulata Bertol., Fl. it. IV., p. 85 (1839). Florenz.
- 39. T. Didieri Jord., Obs. I., 36 (1846). Savoyen und Wallis.
- 40. T. connivens Lev., Or. tul. sav. it. p. 12. Italien.
- 41. T. Baldaccii Mattei in Malpighia VII. (4893). Italien: bei Bologna.
- 42. T. planifolia Jord. Ic. p. 9 (1866-68). Savoyen.
- 43. T. sarracenica Perr. in Bull. Herb. Boiss. 1905, p. 507. Savoyen.
- 44. T. aximensis Perr. et Song. in Bull. Herb. Boiss. 4894, p. 435. Savoyen.
- 45. T. etrusca Lev., Tul. de l'Europe p. 67 (4884). Florenz.
- T. kaghysmanica Fomin in Moniteur du Jard. Bot. Tiflis fasc. 9
 (1908) p. 13. Transkaukasien.
- 47. T. Ostrowskiana Rgl., Descr. pl. nov. in Acta Horti Petr. VIII. p. 649 (1884). Turkestan.

- 48. T. Boissieri Rgl. in Gartenflora 1873, S. 296. Palästina.
- 49. T. balcanica Vel., Dritt. Nachtr. Fl. bulg. S. 65 (1893). Bulgarien.
- T. Schrenkii Rgl., Descr. pl. nov. in Acta Horti Petrop. II., p. 439
 et 452 (4873). Südrußland, Turkestan.
- 54. T. Gesneriana L. Sp. pl. (ed. 14) p. 306 (1753). Süd-Europa.
- 52. T. Kolpakowskiana Rgl., Descr. pl. nov. in Acta Horti Petr. V. 266 (4877). Turkestan.
- 53. T. Behmiana Rgl., Descr. pl. nov. in Acta Horti Petr. VI.. p. 505 (1880). Turkestan.
- 54. T. Kesselringi Rgl., Descr. pl. nov. in Acta Horti Petr. V., 637 (1878). Tian-schan.
- 55. T. tetraphylla Rgl., Descr. pl. nov. in Acta Horti Petr. III., 296 (1875). Tian-schan.
- 56. T. triphylla Rgl., Descr. pl. nov. in Acta Horti Petr. V., 636 (1878).
 Tian-schan.
- 57. T. aristata Rgl., Descr. pl. nov. in Acta Horti Petr. VI., 506 (1880).
 Kuldsha.
- 58. T. sogdiana Bge., Reliq. Lehm. N. 1395 (1851). Turkestan.
- T. armena Boiss., Diagn. pl. nov. or. Sér. II, fasc. 4, p. 99. Armenien, Persien.
- 60. T. brachystemon Rgl., Descr. pl. nov. in Acta Horti Petr. VIII., 279 (1884). Turkestan.
- 64. T. retroflexa Hort. ex Baker Tulipeae N. 11 in Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) p. 282. Gartenform.
- 62. T. orientalis Lev., Tul. de l'Eur. p. 68 (1884). Ungarn.
- 63. T. Billietiana Jord. in Ann. Soc. Lyon. Nouv. Sér. V. (4858) p. 44. Savoyen.
- 64. T. Mauriana Jord., Ic. p. 9 (1866-68). Savoyen.
- 65. T. segusiana Perr. et Song. in Bull. Herb. Boiss. II. (1894) p. 434 et 434. Italien.
- T. mucronata Fomin in Moniteur du Jardin Bot. du Tiflis fasc. 9,
 p. 43 (4908). Transkaukasien.
- 67. T. Boettgeri Rgl., Descr. pl. nov. in Acta Horti Petr. X. (4887) p. 366. Ost-Buchara.
- 68. T. Sprengeri Baker in Gard. Chron. 1894, vol. 2, p. 716. Kleinasien: Amasia.
- T. Leichtlini Rgl., Descr. pl. nov. in Acta Horti Petr. X., p. 366 (1887). — Kaschmir.
- 70. T. Androssowi Litw. in Sched. ad herb. fl. ross. N. 1895 (1908). Transkaspien.
- 74. T. Urumoffii Hayek in Verh. zool.-bot. Ges. in Wien LXI. (1911) S. (110). — Bulgarien.

- 72. T. fulgens Hort. ex Baker, Tulipeae N. 48 in Journ, Linn. Soc. XIV. (1874) p. 285. — Gartenform.
- 73. T. Elwesii Baker in Gard. Chron. XIX. (4883) vol. 2, p. 788. -Teheran.
- 74. T. Batalini Rgl. in Gartenflora 1889, S. 506. Ost-Buchara.
- 75. T. galatica Freyn in Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) p. 186. Kleinasien.
- 76. T. lutea Freyn in Bull. Herb. Boiss, IV. (1896) p. 185. Kleinasien.
- 77. T. brachvanthera Freyn in Bull. Herb. Boiss. IV. (4896) p. 487. Kleinasien
- 78. T. chrysantha Boiss, in Kotschy, Pl. Pers. bor. (1842). Persien, Beludschistan.
- 79. T. acuminata Vahl in Horn, Hort. Hafn. I., 328 (1813). Gartenform.
- 80. T. campsopetala Delaun. ex Lois. Herb. gen. amat. t. 172. Gartenform.
- 81. T. oxypetala Stev., Verz. taur. Pfl. S. 333. Krim.
- 82. T. macrospeila Baker in Gard. Chron. 1883, vol. 2, p. 11. Gartenform.
- 83. T. Marjoletti Perr. et Song. in Bull. Herb. Boiss. II. (1894) p. 432. - Savoven.
- 84. T. macedonica Adamović in herb. Macedonien.
- 85. T. libanotica Rgl. in Gartenflora XXXVII. (4888) S. 426. Libanon.
- 86. T. concinna Bak. in Gard. Chron. XIII. (1893, vol. 1) p. 538. Taurus.
- 87. T. foliosa Stapf in Denkschr. Akad. Wien L., S. 80 (1885). Persien.
- 88. T. cruciata Bak. in Gard. Chron. XIX. (4883, vol. 2) p. 788. Kleinasien.

B. Scabriscapae.

- 89. T. elegans Hort. ex Baker in Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) p. 286. - Gartenform.
- 90. T. praestans Hoog. in Gard. Chron. 1903, vol. 1. p. 324 et 364. Buchara.
- 94. T. suaveolens Roth., Cat. 1.. p. 45 (1797). Südeuropa.
- 92. T. Kaufmanniana Rgl. in Gartenfl. XXVI. (1877) S. 194. Turkestan.
- 93. T. Sommieri Lev. Orig. Tulip. Sav. p. 45. Florenz.
- 94. T. altaica Pall. in Spreng. Syst. veg. II., p. 63. Altai, Tian-Schan.
- 95. T. iliensis Rgl., Descr. pl. nov. in Acta Hort. Petrop. VI. 304. --Turkestan.
- 96. T. Greigi Rgl. in Gartenfl. XXII. (4873) S. 290. Turkestan.
- 97. T. Micheliana Hoog. in Gard. Chron. 1902, vol. 2, p. 350. Transkaspien.
- 98. T. Willmottae Freyn. in Mem. Herb. Boiss. I., No. 43, p. 29 (1900). - Kleinasien (Wan).
- 99. T. Eichleri Rgl. in Gartenflora XXIII. (1874) S. 193. Transkaspien.

- 100. T. Passeriniana Lev., Tulipes de l'Europe No. 18 (1884). La Italien.
- 101. T. Alberti Rgl. Descr. pl. nov. in Acta Horti Petrop. V. 264. Turkestan.
- 102. T. undulatifolia Boiss. Diagn. pl. or. Ser. I, pars 5, p. 57. Gebirge bei Smyrna.
- 103. T. baeotica Boiss. et Heldr., Diagn. pl. or. Sér. II, fasc. 4, p. 99 (1859). Griechenland.
- 404. T. Sintenisii Baker in Gard. Chron. 1891, vol. 1, p. 330. Erzerum.
- 405. T. strangulata Reb. Nonn. Tul. p. 6 (1822). Italien.
- 106. T. variopicta Reb. Sel. sp. Tul. p. 7 (1838). Italien.
- 107. T. neglecta Reb. Sel. Tul. p. 7 (1838). Italien.
- 108. T. maculata Hort. ex Baker, Tulipeae N. 28 in Journ. Linn. Soc. XIV. (1874). Gartenform.
- 109. T. pubescens Willd., Enum. h. Berol. Suppl. 17. Gartenform.
- 140. T. serotina Reb. Sel. Tul. p. 6 (1838). -- Italien.

IV. Saxatiles.

- 144. T. saxatilis Sieb. in Spreng. Syst. II., p. 63 (1825). Insel Kreta.
- 112. T. humilis Herb. in Bot. Reg. XXX. Misc. 30. Persien, Afghanistan.
- 143. T. Aucheriana Baker in Gard. Chron. 1883, vol. 2, p. 168. Persien.
- 114. T. violacea Boiss. u. Buhse, Aufzähl. Transcauc. S. 211. Persien.
- 145. T. Hageri Heldr. in Gartenflora 1874, S. 97. Griechenland.
- 146. T. Theophrasti Candargy, Flore de Lesbos, in Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) p. 143. — Olymp (Lesbos).
- 117. T. pulchella Fenzl in Kotschy, Iter cilic. 379. Kleinasien.
- 448. T. bithynica Griseb., Spicil. II., p. 382. Konstantinopel und Kleinasien.
- T. orphanidea Boiss. sec. Heldr. in Rgl. Gartenflora 1862, S. 309.
 Griechenland.
- 120. T. pseudoviolacea Hausskn. et Siehe in herb. Kleinasien.

V. Silvestres.

- 121. T. Regelii Krassn., Descr. pl. nov. in Scripta Bot. fasc. 3, p. 21 (1887). Turkestan.
- 122. T. biflora Pall., Reise versch. Prov. III. App. N. 86 (1776). Südrußland, Kaukasus.
- 123. T. polychroma Stapf in Polak's Exped. S. 18. Persien.
- 124. T. Callieri Hal. in Dörflers Jahreskatalog 1897, S. 69. Krim.
- 125. T. Lownei Baker, Tulipeae N. 45 in Journ. Linn. Soc. XIV. (1874)p. 294. Syrien.
- 126. T. patens Agardh in Roem. et Schult., Syst. veg. VII., p. 384 (1829).

 Südrußland.

- 127. T. cretica Boiss. et Heldr., Diagn. pl. nov. or. Sér. I, fasc. 43, p. 49.

 Insel Kreta.
- 128. T. primulina Baker in Gard. Chron. XVIII., p. 48. Algerien.
- 129. T. silvestris L., Sp. pl. (ed. 1a) p. 305 (1753). Europa.
- 130. T. turkestanica Rgl. in A. P. Fedtschenkos Reise nach Turkestan, fasc. 12, N. 2 (1876). Turkestan.
- 131. T. alpestris Jord. brev. p. 120 (1866). Savoyen.
- 132. T. Grisebachiana Pantocsek in Öst. Bot. Zeitschr. 4873, S. 265. Herzegowina.
- 133. T. bessarabica Zapał., Consp. fl. Galic. Bessarabien und Rumänien.
- 134. T. australis Link. et Schrad., Journ. II. (1799) 317. Südfrankreich.
- 135. T. gallica Link ex Delaun., Herb. gen. amat. t. 160. Südfrankreich, Nordspanien.
- 136. T. fragrans Munby in Bull. Soc. bot. France XIII. (1866) p. 256. Algerien.
- 137. T. Celsiana DC. ex Red. Lil. I., 1802. Südfrankreich und Norditalien.
- 138. T. Biebersteiniana Roem. et Schult., Syst. veg. VII. (1829) p. 382.
 Südrußland, Kleinasien, Kaukasus, Balkanhalbinsel.
- 139. T. cuspidata Rgl., Descr. pl. nov. in Acta Horti Petr. VIII. (1884) p. 654. Heimat unbekannt.

VI. Orithyia.

- 140. T. uniflora (L.) Bess. ex Baker, Tulipeae N. 46 in Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) p. 295. Tarbagatai, Altai.
- 141. T. heteropetala Led., Icon. fl. ross. I., t. 85. Altai.
- 142. T. nutans (Traut.) comb. nov. Transbaikalien.
- 143. T. heterophylla (Rgl.) Baker, Tulipeae N. 47 in Journ. Linn. Soc. XIV. (1874), p. 295. Tian-schan.
- 144. T. dasystemon Rgl., Descr. pl. nov. in Acta Horti Petr. VI. (1880) p. 504. Tian-schan.
- 145. T. tianschanica Rgl., Descript. pl. nov. in Acta Horti Petr. VI. (1880) p. 508. Tian-schan.
- 146. T. Krauseana Rgl., Descr. pl. nov. in Acta Horti Petrop. VI. (1880)
 p. 508. Turkestan: Karatau-Gebirge.
- 147. **T. edulis** (Miq.) Baker, Tulipeae N. 48 in Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) p. 295. Japan.
- 148. T. erythronioides Baker in Journ. of Botany XIII. (4875) p. 292. China: Prov. Chekiang.